

Ihr Name:

Name des Arztes, der JYSELECA (Filgotinib) verschrieben hat:

Telefonnummer des Arztes:

Datum des Beginns der Einnahme von JYSELECA (Filgotinib):

Tragen Sie diesen Pass stets bei sich, während Sie JYSELECA einnehmen. Zeigen Sie ihn dem Sie behandelnden oder versorgenden medizinischen Fachpersonal, z.B. auch einem Apotheker oder Mitarbeiter in der Notaufnahme.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede bei Ihnen auftretende Nebenwirkung melden. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Gebrauchsinformation.

Besuchen Sie unsere Website:

AT-JYS-0132
Erstellt: November 2021



Patientenpass

Bitte tragen Sie diesen Patientenpass stets bei sich.

Sicherheitsinformationen zu JYSELECA®▼
(Filgotinib) für Patient*innen.



Dieser Patientenpass enthält wichtige Informationen für Patient*innen zur Sicherheit von JYSELECA (Filgotinib). Bitte lesen Sie auch die Gebrauchsinformation.

Galapagos

Infektionen

- Filgotinib kann bestehende Infektionen verschlimmern oder die Wahrscheinlichkeit für eine neue Infektion erhöhen. Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie krank werden oder Anzeichen einer Infektion bemerken, wie z.B.:
 - Fieber oder Schüttelfrost, Kurzatmigkeit, Husten, verstärkte Müdigkeit – dies können Anzeichen einer Lungenentzündung sein
 - Fieber, Schweißausbrüche, Gewichtsverlust oder Husten, der nicht abklingt – dies können Anzeichen einer Tuberkulose sein
 - Schmerzhafter Hautausschlag mit Blasenbildung – dies kann ein Anzeichen einer Gürtelrose (Herpes zoster) sein
- Bevor Sie mit der Einnahme von Filgotinib beginnen, fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie auf Tuberkulose getestet werden sollten, einschließlich auf eine inaktive Infektion.
- Teilen Sie Ihrem Arzt mit, falls Sie kürzlich engen Kontakt mit einer Person hatten, die Tuberkulose hat.

Blutgerinnsel in den Beinvenen oder der Lunge

- Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie Symptome von Blutgerinnseln in Ihren Beinen oder in Ihrer Lunge wie schmerzhafte Schwellung der Beine, Brustschmerzen oder Kurzatmigkeit bekommen.

Cholesterin

Ein hoher Cholesterinspiegel ist ein bedeutsamer Risikofaktor für Herzerkrankungen. Während Ihrer Einnahme von Filgotinib wird Ihr Arzt Ihren Cholesterinspiegel überprüfen, um zu entscheiden, ob Sie eine Behandlung zur Senkung Ihres Cholesterinspiegels benötigen.

Impfstoffe

- Sie sollten während der Einnahme von Filgotinib gewisse Impfstoffe, sogenannte Lebendimpfstoffe, (z.B. Zostavax™ zur Vorbeugung von Gürtelrose) nicht erhalten.
- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker über Impfstoffe, bevor Sie beginnen, Filgotinib einzunehmen. Ihr Arzt oder Apotheker möchte möglicherweise sicherstellen, dass Ihr Impfstatus auf dem neuesten Stand ist.

Schwangerschaft, Verhütung und Stillzeit

Filgotinib darf nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden.

- Nutzen Sie während der Einnahme von Filgotinib sowie für mindestens eine Woche nach der letzten Anwendung eine zuverlässige Verhütungsmethode.
- Nehmen Sie Filgotinib nicht mehr ein und sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie während der Behandlung schwanger werden oder eine Schwangerschaft vermuten.
- Falls Sie schwanger werden möchten, sprechen Sie vorher mit Ihrem Arzt.

Während der Einnahme von Filgotinib dürfen Sie nicht stillen.

Auswirkungen auf die männliche Fortpflanzungsfähigkeit

Es ist möglich, dass Filgotinib die Spermienzahl senkt oder die Spermienqualität beeinflusst. Die Auswirkungen auf die Zeugungsfähigkeit und ein Rückgang möglicher Auswirkungen nach Behandlungsende sind nicht bekannt.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie jetzt oder in der Zukunft ein Kind zeugen möchten.