

# Information du patient

## Belgique

**Galápagos**



**Jyseleca**<sup>®</sup>  
filgotinib

## Notice : Information du patient

### Jyseleca 100 mg comprimés pelliculés Jyseleca 200 mg comprimés pelliculés filgotinib

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

#### **Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que Jyseleca et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Jyseleca
3. Comment prendre Jyseleca
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Jyseleca
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Jyseleca et dans quels cas est-il utilisé**

Jyseleca contient la substance active filgotinib. Il appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs des Janus Kinases, qui contribuent à réduire l'inflammation.

##### **Polyarthrite rhumatoïde**

**Jyseleca est utilisé pour traiter les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde**, une maladie inflammatoire des articulations. Il peut être utilisé si un traitement précédent n'a pas été suffisamment efficace ou n'a pas été toléré. Jyseleca peut être utilisé seul ou en association avec un autre médicament contre l'arthrite, le méthotrexate.

**Jyseleca réduit l'inflammation dans votre corps.** Il aide à réduire la douleur, la fatigue, la raideur et le gonflement des articulations, et il ralentit l'altération de l'os et du cartilage au niveau des articulations. Ces effets peuvent vous aider à effectuer vos activités quotidiennes habituelles et à améliorer votre qualité de vie.

##### **Rectocolite hémorragique**

Jyseleca est utilisé pour traiter les adultes atteints de rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire du gros intestin. Il peut être utilisé si vous ne répondez pas suffisamment ou étiez intolérants à un traitement antérieur de la rectocolite hémorragique. Il contribue à réduire les signes et les symptômes de la rectocolite hémorragique et à diminuer votre besoin de stéroïdes.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Jyseleca

### Ne prenez jamais Jyseleca

- **si vous êtes allergique** au filgotinib ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- **si vous avez une tuberculose (TB) active.**
- **si vous avez une infection grave active** (voir la rubrique « Avertissements et précautions »).
- **si vous êtes enceinte** ou pensez être enceinte.

➔ Si vous vous trouvez dans l'un de ces cas, **ne prenez pas Jyseleca et prévenez immédiatement votre médecin.**

### Avertissements et précautions

**Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien** avant de prendre Jyseleca :

- **si vous avez une infection**, ou si vous développez souvent des infections. Informez votre médecin si vous présentez des symptômes tels que fièvre, plaies, sensation d'être plus fatigué(e) que d'habitude ou problèmes dentaires, car il peut s'agir de signes d'une infection. Jyseleca peut réduire la capacité de votre corps à combattre les infections et peut aggraver une infection existante ou augmenter le risque de contracter une nouvelle infection. Si vous souffrez de diabète ou êtes âgé(e) de 65 ans ou plus, il est possible que vous présentiez un risque accru de contracter des infections.
- **si vous avez déjà eu la tuberculose (TB)** ou avez été en contact avec une personne ayant la tuberculose. Il se peut que vous deviez subir un test de dépistage de la tuberculose avant que vous ne receviez et au cours du traitement par Jyseleca.
- **si vous avez déjà eu un zona** dans le passé, Jyseleca risque de la réactiver. Informez votre médecin si vous présentez une éruption cutanée douloureuse avec des cloques pendant le traitement par Jyseleca, car il peut s'agir de signes de zona.
- **si vous avez déjà eu une hépatite B ou C.**
- **si vous avez ou avez déjà eu un cancer, si vous fumez ou avez fumé dans le passé**, car votre médecin discutera avec vous pour déterminer si Jyseleca est approprié pour vous.
- **Un cancer de la peau non mélanomateux a été observé chez les patients prenant Jyseleca.** Votre médecin peut vous recommander de faire des examens réguliers de la peau pendant que vous prenez Jyseleca. Informez votre médecin si de nouvelles lésions cutanées apparaissent pendant ou après le traitement ou si des lésions existantes changent d'apparence.
- **si vous vous êtes fait récemment vacciner** ou prévoyez de vous faire vacciner. Certains types de vaccins (vaccins vivants) ne sont pas recommandés pendant l'utilisation de Jyseleca. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Jyseleca. Ils voudront probablement s'assurer que vous êtes à jour dans vos vaccins.
- **si vous avez ou avez déjà eu des problèmes de cœur**, car votre médecin discutera avec vous pour déterminer si Jyseleca est approprié pour vous.
- **si vous avez déjà eu des caillots sanguins** dans les veines de vos jambes (thrombose veineuse profonde) ou de vos poumons (embolie pulmonaire) ou présentez un risque accru d'en développer (par exemple : si vous avez subi une intervention chirurgicale majeure récente, si vous utilisez des contraceptifs hormonaux/un traitement hormonal substitutif, si une anomalie de la coagulation a été identifiée chez vous ou chez vos proches). Votre médecin discutera avec vous pour déterminer si Jyseleca est approprié pour vous. Informez votre médecin en cas d'essoufflement soudain ou de difficultés à respirer, de douleur thoracique ou de douleur dans le haut du dos, de gonflement de vos jambes ou bras, de douleur ou de sensibilité dans les jambes, ou de rougeur ou décoloration des jambes ou des bras, car cela peut être le signe de la présence de caillots sanguins dans les veines.

### Personnes âgées

Les patients âgés de 65 ans et plus peuvent présenter un risque accru d'infections, de crise cardiaque et de certains types de cancer. Votre médecin peut décider que Jyseleca n'est pas approprié dans votre cas.

### **Enfants et adolescents**

Ne donnez pas ce médicament aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans car il n'a pas été étudié dans cette tranche d'âge.

### **Autres médicaments et Jyseleca**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, en particulier si vous utilisez des médicaments qui affectent votre système immunitaire (tels que la ciclosporine ou le tacrolimus).

Il est aussi très important que vous préveniez votre médecin ou pharmacien si vous prenez :

- des médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque, la maladie coronarienne ou l'hypertension (tels que diltiazem ou carvedilol)
- le médicament fénofibrate (utilisé pour traiter un cholestérol élevé)

### **Grossesse, contraception et allaitement**

#### *Grossesse*

**Jyseleca ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.** Si vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, ne prenez pas ce médicament. Demandez conseil à votre médecin.

#### *Contraception*

**Veillez à éviter toute grossesse pendant que vous prenez Jyseleca.** Vous devez utiliser une contraception fiable pendant que vous prenez Jyseleca, et pendant au moins 1 semaine après avoir pris votre dernière dose de Jyseleca. Si vous débutez une grossesse pendant que vous prenez Jyseleca, arrêtez de prendre les comprimés et prévenez immédiatement votre médecin.

#### *Allaitement*

**N'allaitiez pas pendant que vous prenez Jyseleca.** On ne sait pas si la substance active est excrétée dans le lait maternel.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Jyseleca peut provoquer des sensations vertigineuses et des vertiges. Si vous ressentez des sensations vertigineuses lorsque vous prenez Jyseleca, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines.

### **Jyseleca contient du lactose**

Chaque comprimé pelliculé de 100 mg de Jyseleca contient 76 mg de lactose, et chaque comprimé pelliculé de 200 mg de Jyseleca contient 152 mg de lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## **3. Comment prendre Jyseleca**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

**La dose recommandée** est d'un comprimé de 200 mg ou de 100 mg une fois par jour.

Si vous êtes âgé(e) de 65 ans ou plus et êtes atteint(e) de polyarthrite rhumatoïde ou si vous avez des problèmes rénaux, votre médecin peut recommander une dose d'un comprimé de 100 mg une fois par jour. Jyseleca ne vous est pas recommandé si vous êtes âgé(e) de plus de 75 ans et atteint(e) de rectocolite hémorragique. Informez votre médecin si vous avez de graves problèmes de foie, car Jyseleca n'est pas recommandé dans ce cas.

Avalez votre comprimé avec un verre d'eau. Ne pas diviser ni écraser ni mâcher le comprimé avant de l'avaler car cela pourrait modifier la quantité de médicament absorbée dans votre corps. Vous pouvez prendre Jyseleca avec de la nourriture ou entre les repas. Ne pas avaler le déshydratant.

Prenez Jyseleca à la même heure chaque jour. Cela vous aidera à vous souvenir de prendre les comprimés.

Votre médecin peut interrompre le traitement temporairement ou définitivement si les analyses de sang révèlent un faible nombre de globules blancs ou rouges.

#### **Si vous avez pris plus de Jyseleca que vous n'auriez dû**

Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, prévenez immédiatement votre médecin.

#### **Si vous oubliez de prendre Jyseleca**

- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez.
- Si vous avez passé une journée entière (24 heures) sans prendre une dose, il suffit d'omettre la dose oubliée et de prendre une seule dose à votre heure habituelle.
- Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

#### **Si vous arrêtez de prendre Jyseleca**

Si vous arrêtez de prendre Jyseleca, prévenez immédiatement votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### **Effets indésirables graves**

Consultez votre médecin ou demandez immédiatement une aide médicale si vous présentez des signes d'infection grave tels que :

- fièvre et symptômes d'infection des voies urinaires (mictions plus fréquentes que d'habitude, douleur ou gêne lors de la miction ou douleur au dos). Les infections des voies urinaires sont fréquentes (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 10), et certaines de ces infections peuvent être graves.
- infection pulmonaire (pneumonie) : les symptômes peuvent inclure une toux persistante, de la fièvre, un essoufflement et de la fatigue. Cet effet est peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100).
- zona : les symptômes peuvent inclure une éruption cutanée douloureuse avec des cloques. Cet effet est peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100).
- infection du sang (sepsis) : peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

#### **Autres effets indésirables**

Prévenez votre médecin si vous ressentez l'un quelconque des effets indésirables suivants :

#### **Fréquent**

(peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- infections de la gorge et du nez
- sensations vertigineuses
- envie de vomir (nausées)

*Les analyses de sang peuvent révéler :*

- un faible nombre de globules blancs (lymphocytes).

### **Peu fréquent**

(peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

- impression de tête qui tourne (vertiges)

*Les analyses de sang peuvent révéler :*

- un faible nombre de globules blancs (neutrophiles)
- l'augmentation d'une enzyme musculaire appelée créatinine phosphokinase
- une augmentation du taux de graisses dans le sang (cholestérol).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

#### **France**

*Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)  
et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance  
Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>*

#### **Belgique**

*Agence fédérale des médicaments et des produits de santé  
Division Vigilance*

<i>Avenue Galilée 5/03 1210 BRUXELLES</i>	<i>Boîte Postale 97 1000 BRUXELLES Madou</i>
---	--

*Site internet: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)  
e-mail: [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)*

#### **Luxembourg**

*Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la  
Direction de la santé  
Site internet : [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)*

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. Comment conserver Jyseleca**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et le flacon après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité. Conserver le flacon soigneusement fermé. N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que le joint d'étanchéité du flacon est brisé ou manquant.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient Jyseleca

- La substance active est le filgotinib. Chaque comprimé pelliculé contient 100 mg ou 200 mg de filgotinib (sous forme de maléate de filgotinib).
- Les autres composants sont :  
*Noyau du comprimé* : cellulose microcristalline, lactose monohydraté, amidon prégélatinisé, dioxyde de silicium colloïdal, acide fumarique, stéarate de magnésium  
*Pelliculage* : alcool polyvinylique, dioxyde de titane (E171), macrogol, talc, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172)

### Comment se présente Jyseleca et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés pelliculés de 100 mg de Jyseleca sont de couleur beige, de 12 mm x 7 mm, en forme de gélule et portent l'inscription « G » sur une face et « 100 » sur l'autre face.

Les comprimés pelliculés de 200 mg de Jyseleca sont de couleur beige, de 17 mm x 8 mm, en forme de gélule et portent l'inscription « G » sur une face et « 200 » sur l'autre face.

Jyseleca 100 mg et 200 mg sont disponibles en flacons de 30 comprimés et en boîtes de 3 flacons, qui contiennent chacun 30 comprimés. Chaque flacon contient un déshydratant de gel de silice qui doit être conservé dans le flacon pour mieux protéger les comprimés. Le déshydratant de gel de silice est contenu dans un sachet ou une cartouche spécifique et ne doit pas être avalé.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Galapagos NV  
Gen. De Wittelaan L11 A3  
2800 Mechelen  
Belgique

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

#### **België/Belgique/Belgien**

Galapagos Biopharma Belgium BV  
Tél/Tel: 00800 7878 1345

#### **Lietuva**

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab  
Tel: +358 201 558 840

#### **България**

Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.  
Тел.: +359 2 437 4997

#### **Luxembourg/Luxemburg**

Galapagos Biopharma Belgium BV  
Tél/Tel: 00800 7878 1345

#### **Česká republika**

Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.  
Tel: + 420 296 183 236

#### **Magyarország**

Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.  
Magyarországi fióktelepe  
Tel.: +36 1 998 9947

#### **Danmark**

Galapagos Biopharma Denmark ApS  
Tlf: 00800 7878 1345

#### **Malta**

Sobi Single Member IKE  
Tel: +30 210 700 81 00

**Deutschland**

Galapagos Biopharma Germany GmbH  
Tel: 00800 7878 1345

**Eesti**

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab  
Tel: +358 201 558 840

**Ελλάδα**

Sobi Single Member IKE  
Τηλ: +30 210 700 81 00

**España**

Galapagos Biopharma Spain, SLU.  
Tel: 00800 7878 1345

**France**

Galapagos SASU  
Tél: 00800 7878 1345

**Hrvatska**

Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.  
Tel: +385 1 79 00 196

**Ireland**

Galapagos Biopharma Ireland Ltd  
Tel: 00800 7878 1345

**Ísland**

Galapagos Biopharma Denmark ApS  
Sími: T: 00800 7878 1345

**Italia**

Galapagos Biopharma Italy S.r.l.  
Tel: 00800 7878 1345

**Κύπρος**

Sobi Single Member IKE  
Τηλ: +30 210 700 81 00

**Latvija**

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab  
Tel: +358 201 558 840

**Nederland**

Galapagos Biopharma Netherlands B.V.  
Tel: 00800 7878 1345

**Norge**

Galapagos Biopharma Norway AS  
Tlf: 00800 7878 1345

**Österreich**

Galapagos Biopharma Austria GmbH  
Tel: 00800 7878 1345

**Polska**

Swedish Orphan Biovitrum Sp.z o.o., Oddział w  
Polsce  
Tel.: +48 22 206 98 63

**Portugal**

Swedish Orphan Biovitrum S.L.  
Tel: +34 913913580

**România**

Swedish Orphan Biovitrum  
Tel: +40 31 229 51 96

**Slovenija**

Swedish Orphan Biovitrum Podružnica v Sloveniji  
Tel: +386 1 828 0538

**Slovenská republika**

Swedish Orphan Biovitrum o.z.  
Tel: +421 2 3211 1540

**Suomi/Finland**

Galapagos Biopharma Finland Oy  
Puh/Tel: 00800 7878 1345

**Sverige**

Galapagos Biopharma Sweden AB  
Tel: 00800 7878 1345

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Galapagos Biotech Limited  
Tel: 0800 072 7878

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 01/2024**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments <http://www.ema.europa.eu>.

Code QR à inclure

[www.jyseleca.eu](http://www.jyseleca.eu)