

**Nome:**

---

---

**Nome do médico (que prescreveu Jyseleca):**

---

---

**N.º de telefone do médico:**

---

---

**Data em que iniciou Jyseleca:**

---

---

Tenha este cartão sempre consigo enquanto estiver a tomar este medicamento. Mostre o cartão a todos os profissionais de saúde envolvidos nos seus cuidados ou tratamentos, por exemplo um farmacêutico ou um médico nas urgências.

▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Poderá ajudar, comunicando quaisquer efeitos indesejáveis que tenha, através dos contactos: Formulário online do Portal RAM disponível no site do INFARMED, I.P. em: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram> (preferencialmente) ou Direção de Gestão do Risco de Medicamentos: Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil, 53, 1749-004 Lisboa. Tel: 21 798 73 73 e Linha do Medicamento: 800 222 444 (Gratuita) E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt) Swedish Orphan Biovitrum, S.L. Telefone: +351 21 464 32 25

# Cartão de Alerta para o Doente



Este cartão contém informações importantes de segurança para os doentes. Leia o folheto informativo para mais informações.

## Infeções graves e oportunistas

- Este medicamento pode agravar uma infecção existente ou aumentar a probabilidade de desenvolver uma nova infecção. Fale, imediatamente, com o seu médico se ficar doente ou notar sinais de infecção grave ou oportunista, tais como:
  - Febre ou arrepios, falta de ar, tosse, sentir-se mais cansado/a do que o habitual — podem ser sinais de pneumonia;
  - Febre, transpiração excessiva, perda de peso ou tosse que não desaparece — podem ser sinais de tuberculose (TB);
  - Erupção na pele dolorosa com bolhas — podem ser sinais de zona (herpes zoster).
- Antes de começar a tomar este medicamento, pergunte ao seu médico se deve fazer o teste da TB, incluindo avaliação de infecção latente.
- Informe o seu médico se esteve recentemente em contacto com alguém que tenha TB.

## Cancro e cancro da pele

- Este medicamento pode levar a um risco acrescido de cancro.

Informe o seu médico se descobrir algum novo crescimento na sua pele.

## Coágulos de sangue nas veias das pernas ou dos pulmões

- Informe, imediatamente, o seu médico se tiver subitamente falta de ar ou dificuldade em respirar, dor no peito ou dor nas costas, inchaço da perna ou do braço, dor ou sensibilidade na perna ou vermelhidão ou descoloração da perna ou do braço, pois estes podem ser sinais de coágulos de sangue nas veias.

## Colesterol

O colesterol elevado é um importante fator de risco de doença cardíaca. Enquanto estiver a tomar este medicamento, o seu médico irá monitorizar os seus valores de colesterol.

## Vacinas

- Não deve tomar algumas vacinas (vivas) enquanto estiver a tomar este medicamento.
- Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre as vacinas, antes de começar a tomar este medicamento.

Eles poderão querer certificar-se de que tem as suas vacinas em dia.

## Gravidez, contraceção e amamentação

Este medicamento não pode ser utilizado na gravidez:

- Utilize um método contraceptivo eficaz enquanto estiver a tomar este medicamento e durante 1 semana, depois de tomar a última dose;
- Se pretender engravidar, fale com o seu médico antes de iniciar o tratamento;
- Se engravidar enquanto estiver a tomar Jyseleca, pare de tomar os comprimidos e fale com o seu médico imediatamente. Não amamente enquanto estiver a tomar este medicamento.

## Doença cardíaca

Este medicamento pode levar a um aumento do risco de certas doenças cardíacas. Informe o seu médico se experimentar dor forte e intensa no peito (que pode alastrar aos braços, maxilar, pescoço e costas), falta de ar ou tonturas.

Data de concordância: Novembro/2023 Versão 2.  
NP-29417